

Целая и дробная части числа

1. $[x] = -[x]$.
2. а) $\left[-1; \frac{3-\sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{3+\sqrt{17}}{2}; 4\right]$; б) $\left(\frac{13}{3}; \frac{16}{3}\right]$.
3. Пусть $a = [a] + \alpha$, где $\alpha \neq 0$, а $x = 1 - \alpha$. Тогда $[x + a] = 1 + [a]$, $[x] + [a] = [1 - \alpha] + [a] = [a]$, т.е. $[x + a] \neq [x] + [a]$.
4. См. рис.3. 5. См. рис.4.





Рис. 3





Рис. 4

6. Пусть $[x] = k$, $[y] = l$. Тогда $[x] + [y] + [x + y] = 2k + 2l + [\alpha + \beta]$, $[2x] + [2y] = 2k + 2l + [2\alpha] + [2\beta]$. Неравенство же $[\alpha + \beta] \leq [2\alpha] + [2\beta]$ почти очевидно. Оно справедливо при $\alpha + \beta < 1$, а при $\alpha + \beta \geq 1$ хотя бы одно из чисел α или β не меньше $\frac{1}{2}$, так что $[\alpha + \beta] = 1 \leq [2\alpha] + [2\beta]$.

7. См. рис.5.
9. Пусть $\alpha = \{x\}$. Тогда $\{k\{x + \alpha\}\} = \{k\alpha\} = \{k[x] + k\alpha\} = \{kx\}$.

Уравнение имеет решение $0; \frac{1}{2}$.

10. а) $\frac{2n+1}{6}$, где $n \in \mathbf{Z}$; б) $\frac{n}{7}$, где $n \in \mathbf{Z}$, $n \neq 7k$.

11. а) Прямые вида $y - x = n$, где $n \in \mathbf{Z}$.
- б) См. рис.3, а).

12. Все $n < 0$; $[n; \sqrt{n^2 + 1}]$ при $n \geq 0$, $n \in \mathbf{Z}$.

13. $\frac{19}{4}$. Пусть $[x] = k$. Тогда $\{x\} \geq \frac{3}{k}$, но это значит, что $k \geq 4$. При $k = 4$ получаем наименьшее значение дробной части $\{x\} = \frac{3}{4}$.

14. а) Указание. Если $k \leq \sqrt{[x]} < k+1$, то $k^2 \leq [x] < (k+1)^2$, но тогда и $k^2 < [x] + \{x\} < (k+1)^2$, т.е. $k \leq \sqrt{x} < k+1$.

- б) a – целое число. Решение аналогично решению пункта а). Пусть $[\log_a [x]] = k$, тогда $k \leq \log_a [x] < k+1$, $a^k \leq [x] < a^{k+1}$. Если a – целое число, то тогда и $a^k < x < a^{k+1}$, т.е. $k < \log_a x < k+1$. Если же a – не целое число, то существует натуральное k , для которого $x = a^k$ – тоже не целое. Но тогда

$$[\log_a a^k] = [k] = k > \log_a [a^k] \geq [\log_a [a^k]].$$

15. Указание. Пусть $(5 + \sqrt{26})^n = A_n + B_n \sqrt{26}$, где A_n и B_n – натуральные числа. Тогда $(5 - \sqrt{26})^n = A_n - B_n \sqrt{26}$. Значит, $(5 + \sqrt{26})^n + (5 - \sqrt{26})^n = 2A_n$, $|(5 - \sqrt{26})^n| = \frac{1}{(5 + \sqrt{26})^n} < \frac{1}{10^n}$.

16. а) $n = 2$. При $n > 2$

$$\left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{4}\right] + \dots + \left[\frac{n}{2^m}\right] + \dots < \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + \frac{n}{2^m} + \dots = n.$$

- б) Нет. в) Нет. Воспользуйтесь тем, что

$$\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \dots + \left[\frac{n}{p^m}\right] + \dots < \frac{n}{p} + \frac{n}{p^2} + \dots + \frac{n}{p^m} + \dots = \frac{n}{p-1} < n-k$$

при достаточно больших n .

17. n . Указание. $(n+1)(n+2)\dots(2n) = \frac{(2n)!}{n!}$.

18. Пусть p – простое число. Тогда

$$\left[\frac{n!}{p}\right] + \left[\frac{n!}{p^2}\right] + \dots + \left[\frac{n!}{p^k}\right] + \dots \geq (n-1)! \left(\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \dots + \left[\frac{n}{p^k}\right] + \dots \right).$$

(Мы воспользовались неравенством $[kx] \geq k[x]$ при натуральном k .)

19. а) Поскольку $(2n)!! = 2^n \cdot n!$, показатель степени двойки, на которую делится $(2n)!!$, равен $n + \left[\frac{n}{2}\right] + \dots + \left[\frac{n}{2^k}\right] + \dots$, а для $p > 1$ этот показатель равен показателю для числа $n!$.

- б) 0 при $p = 2$, $\sum_k \left(\left[\frac{2n}{p^k}\right] - \left[\frac{n}{p^k}\right] \right)$ при $p > 2$. Указание. Вос-




Рис. 5